

良品多収のキメテ登場！

# バートル®

1号 チッソ リンサン カリ クド 10-35-15-1

マンガン(0.1) ホウソ(0.05) 亜鉛(0.005)

健苗育成

2号 チッソ リンサン カリ クド 34-5-5-1

マンガン(0.5) ホウソ(0.2) 鉄(0.06) 銅(0.05) 亜鉛(0.05) モリブデン(0.03)

生育促進



サンアグロの

新葉面散布剤



サンアグロ

各1kg入り



## 【成分】

銘柄	チッソ	リンサン	カリ	苦土	微量元素
バイトール1号	10	35	15	1	マンガン 0.1    ホウソ 0.05 亜鉛 0.005
バイトール2号	34	5	5	1	マンガン0.5    ホウソ0.2    鉄0.06 銅0.05    亜鉛0.05    モリブデン0.03

## 【効果】

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 葉菜・果菜類の増収と品質向上</li> <li>2. 果物の増収と品質向上</li> <li>3. 水稲・野菜の健苗育成</li> <li>4. 発根・活着促進</li> <li>5. 貯蔵養分の充実</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 耐寒性の向上</li> <li>7. 微量元素欠乏の早期回復</li> <li>8. 病虫害の早期回復</li> <li>9. 霜害・雹害・干害・湿害・風害・水害<br/>塩害・薬害・肥料障害の早期回復</li> </ol> |
|---|--|

## 【使い方】

作物名	施用時期	稀釈倍数 (倍)	施用回数 (回)	農薬混合の場合 の稀釈培数 (倍以上)
水稲田植機用苗	緑化後～田植当日	200～400	4～7	400
キュウリ・トマト・ナス・ピーマン イチゴ・メロン・スイカ・カボチャ	定植後～収穫期	250～500	7～8	500
ホウレンソウ・ハクサイキャベツ・レタス セルリー・ブロッコリ・ハナヤサイ	間引後または 定植後～収穫期	200～400	4～5	400
ダイコン・ニンジン・コボウ・カブ	発芽14日後～収穫期	300～400	3～5	400
柑きつ類	結果期・収穫期	300～400	5～10	400
リンゴ・モモ・ナシ・カキブドウ・ウメ サクランボ・キウイ	萌芽期・果実肥大期 収穫直後	300～400	4～6	400
茶	11月～12月上旬 3月～4月	500	2～3	500
芝	生育期全般	150～200	8～10	200

【使用上の注意】 ・晴天時の日中の散布は避けてください。 ・巨峰や廿世紀に散布する場合は袋掛後に行なってください。

®はサンアグロ株式会社の登録商標です。

製造元



取扱店