

マツノマダラカミキリから大切な松を守る

# ヤシマ モリエート<sup>®</sup> マイクロカプセル

®：モリエートは住友化学株式会社の登録商標です

特長

優れた後食防止効果を  
マイクロカプセル化で更に長く

6.7L入  
×2



マツノマダラカミキリ



この写真はイメージです



住化グリーン株式会社  
東京都中央区八丁堀4丁目5番4号

成分：クロチアニジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7.5%  
 [(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン]  
 水等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92.5%  
 性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

環境にやさしい  
5つの特性




● 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ 成虫	100~ 200倍	3ℓ/本 (樹高10m)	成虫の 発生初期	4回以内	散布	4回以内
		15倍	3ℓ/10a			無人ヘリコプター による散布	

● 基礎試験 (2008年ヤシマ産業)

ヤシマモリエートマイクロカプセルの効果 (散布8週間後)



● 使用上の注意

⚠ 薬効・薬害等の注意

- 使用前によく振って使用する。
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさける (効果)
- 本剤によるマツノマダラカミキリ成虫防除は後食防止を目的とするものであり、成虫の発生初期に時期を失ないように散布する (効果)
- 散布液量は、樹高10mのまつ1本当り3ℓを標準とし、木の大きさにより適宜増減し、樹冠部を中心に全面に散布する (効果)
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる。
  - 桑にかからないように注意 (蚕毒)
  - ミツバチに対する注意
    - ・ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しない。
    - ・養蜂地区では周辺への飛散に注意し危害防止に努める。
  - 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さない。空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
  - 街路、公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後 (最小限その当日) に関係者以外に立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 保 管：密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷蔵な所。

製 造 社 住化グリーン株式会社

本 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4 丁目 5 番 4 号  
 TEL. 03-3523-8070 FAX. 03-3523-8071  
 下館工場 〒308-0007 茨城県筑西市折本 5 4 0  
 TEL. 0296-22-5101 FAX. 0296-22-7101

製 造 場 住友化学株式会社 大分工場  
 大分県大分市鶴崎2200

小分製造場 住化アグロ製造株式会社 庄原工場  
 広島県庄原市川北町123