

ベントグリーン用スズメノカタビラ専用発芽前除草剤

マックワン フロアブル

そして、ついに今！
「メヒシバ」に適用拡大！

有効成分：クミルロン 45.0%

・・・そしてより美しく


スズメノカタビラ

メヒシバ

マックワンフロアブル・「メヒシバ」 適用拡大技術資料

2011 年植調試験結果			
散布時期	メヒシバ発生前		
試験地	茨城 GC (茨城県)	太平洋クラブ美野里 (茨城県)	真名 CC (千葉県)
散布日	2011 年 4 月 13 日	2011 年 3 月 30 日	2011 年 5 月 6 日
芝種	ベントグラス	ベントグラス (ブライトン)	ベントグラス (SR1020)
調査日	2011 年 6 月 12 日 (60 日後)	2011 年 6 月 9 日 (71 日後)	2011 年 7 月 2 日 (57 日後)
結果	極大 (発生率 0%)	極大 (発生率 0.2 ~ 3%)	極大 (1.5mℓ / m ²) / 大 (1mℓ / m ²)
薬害	無	無	無

太平洋クラブ美野里試験写真・2011 年 7 月 12 日撮影



スズメノカタビラの発芽前除草剤として、安全性と効果の点で高い評価を得ていた「マックワンフロアブル」が本年(2012年)「メヒシバ」への適用拡大が認められました。

夏場の難防除雑草である「メヒシバ」への大きな武器として皆様にご利用いただけることを大いに期待申し上げる次第です。

暖地型地域では、メヒシバの発芽時期は、スズメノカタビラの春の発芽時期よりもやや遅いので必ずしも 1 回の処理で同時に両方の雑草の防除を果たすことは難しいかもしれません。しかし、計画的に散布時期を考慮することにより、メヒシバの発生を安全に高い効果で抑えることが可能です。メヒシバの種類や気候条件によって、散布量や散布時期を検討する必要がありますので詳しくは販売店までご連絡ください。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤及びクミルロンを含む農薬の総使用回数	使用方法
			薬量	希釈水量		
西洋芝 (ベントグラス)	スズメノカタビラ メヒシバ	芝生育期 (雑草発生前)	1 ~ 2ℓ / 10a (1 ~ 2mℓ / m ²)	200 ~ 300ℓ / 10a (200 ~ 300mℓ / m ²)	2 回以内	全面土壌散布
西洋芝 (ブルーグラス)						
西洋芝 (ペレニアルライグラス)	スズメノカタビラ	芝発芽後 (は種後 10 日前後) ~ 芝生育期 (雑草発生前)				

販売店

(製造販売元) **丸紅株式会社**

無機・農業化学品部 農業化学品課

〒100-8088 東京都千代田区大手町 1 丁目 4 番 2 号

tel:(03)3282-4128 fax:(03)3282-9655